


# TARCEVA – klinický registr

## Karcinom pankreatu

Stav k datu 10. 4. 2011

Registr Tarceva je podporován  
výzkumným grantem firmy Roche.

# Stav registru - karcinom pankreatu



**Záznam je považován za úplný pokud má vyplněny tyto parametry:**

- *PS v době zahájení léčby Tarcevou*
- *TNM klasifikace a stadium primárního nádoru*
- *Histologický typ primárního nádoru*
- *Datum zahájení léčby Tarcevou*
- *Stadium onemocnění v době zahájení léčby Tarcevou*
- *Linie léčby, kdy je poprvé podávána Tarceva*
- *Nejlepší dosažená odpověď při léčbě Tarcevou*
- *Současný stav a k němu příslušné datum.*

# Počet pacientů dle jednotlivých center



Název centra	Celkový počet pacientů v registru Tarceva		Počet pacientů s úplným záznamem	
	N	%	N	%
1. VFN Praha - Onkologická klinika	4	6,7	4	7,5
2. FN Na Bulovce Praha – Ústav rad. onkol.	4	6,7	3	5,7
3. FNKV Praha – RTO klinika	2	3,3	2	3,8
4. FTN Praha – Onkol. odd.	1	1,7	1	1,9
5. ÚVN – Onkologie	1	1,7	1	1,9
6. ČB – Onkologie	1	1,7	1	1,9
7. FN Plzeň – RTO	4	6,7	2	3,8
8. KN Liberec – ORKO	3	5,0	2	3,8
9. FNHK – Klinika O-RT	4	6,7	4	7,5
10. FN Olomouc – Onkologická klinika	13	21,7	11	20,8
11. MOÚ Brno – KKOP	23	38,3	22	41,5
<b>Celkový součet</b>	60	100,0	53	100,0


*7 pacientů nemá doposud uzavřený záznam a vyplněny všechny parametry.*

# Počet pacientů léčených Tarcevou dle roku zahájení léčby



N = 53

*Rok zahájení léčby Tarcevou*




# Zastoupení věkových kategorií v době zahájení léčby Tarcevou



N = 53

## Věkové kategorie




	Věk
Průměr	59 let
Medián	61 let
Min – Max	30 – 76 let



# Pohlaví pacientů a performance status




N = 53



### Pohlaví



	<b>Ženy</b>	N = 22; 41,5%
	<b>Muži</b>	N = 31; 58,5%

### Performance status v době zahájení léčby Tarcevou




	<b>PS = 0</b>	N = 14; 26,4%
	<b>PS = 1</b>	N = 39; 73,6%

# Histologie a lokalizace primárního nádoru




N = 53

### Histologie primárního nádoru



### Lokalizace primárního nádoru




# Klinické stadium nádoru a linie léčby v době zahájení léčby Tarcevou




N = 53

## Klinické stadium primárního nádoru v době zahájení léčby Tarcevou



Všichni tři pacienti, kteří mají zaznamenáno stadium jiné, má ve specifikaci uvedeno stadium IIB.

## Linie léčby podání Tarcevy









# Stav léčby a důvody jejího ukončení

N = 53

## Stav léčby Tarcevou



-  **Aktuálně léčeni pacienti** N = 4; 7,5%
-  **Pacienti s přerušenu léčbou** N = 1; 1,9%
-  **Pacienti s ukončenou léčbou** N = 48; 90,6%

Všichni aktuálně léčeni pacienti i pacient s přerušenu léčbou mají údaje naposledy aktualizovány v roce 2009.

## Důvody ukončení léčby Tarcevou

	N	%
Progrese onemocnění	34	70,8
Odmítnutí pacientem	5	10,4
Nežádoucí účinek Tarcevy	1	2,1
Jiný*	5	10,4
Neznámo	3	6,3
<b>Celkem</b>	<b>48</b>	<b>100,0</b>


- \* V kategorii jiné byly zaznamenány tyto varianty:
- hematotoxicita gemcitabinu
  - průjmy
  - krvácení do GIT při progresi nemoci
  - nejasné plicní infiltráty, v.s. progrese onemocnění, progrese dušnosti
  - nedostupnost Tarcevy

# Délka léčby u pacientů s ukončenou léčbou



N = 48 (Pouze pacienti s ukončenou léčbou)

## Délka léčby



Délka léčby	
Počet pacientů <sup>1)</sup>	43
Průměr	6,1 měsíců
Medián	4,9 měsíců
Min – Max	0,3 – 18,8 měsíců


<sup>1)</sup> U pěti pacientů nebylo možné určit délku léčby z důvodu neúplných dat.

# Nežádoucí účinky



N = 53

## Výskyt nežádoucích účinků u pacientů



- Bez nežádoucích účinků N = 33; 62,3%
- Výskyt nežádoucího účinku N = 20; 37,7%

U 20 pacientů bylo zaznamenáno 21 nežádoucích účinků.

## Typy nežádoucích účinků u pacientů

Nežádoucí účinek	N <sup>1)</sup>	% pacientů
Vyrážka	14	26,4
Průjem	4	7,5
Nespecifikováno	3	5,7



## Závažnost nežádoucích účinků

Typ	Grade	N <sup>1)</sup>	%
Vyrážka	G1	8	15,1
	G2	6	11,3
Průjem	G1	3	5,7
	G2	1	1,9


<sup>1)</sup> Počet pacientů, u kterých se objevil daný typ nežádoucího účinku.

# Nejlepší dosažená léčebná odpověď na léčbu Tarcevou



N = 53


## Léčebná odpověď



# Současný stav pacientů

N = 53

## Současný stav



Z 16 pacientů, u kterých je v současném stavu uvedeno, že žijí, je celkem 13 pacientů naposledy aktualizováno v průběhu roku 2009, 1 pacient je aktualizován v lednu 2010 a zbylí dva jsou aktualizováni v dubnu 2011.

# Celkové přežití a přežití bez známek progresse od data zahájení léčby Tarcevou



## Celkové přežití

Počet pacientů	53
Medián OS (95% IS)	11,3 měsíců (5,6; 16,9)
6měsíční přežití (95% IS)	79,8 (67,8; 91,8)
1leté přežití (95% IS)	47,3 (30,8; 63,8)

## Přežití bez známek progresse

Počet pacientů	52
Medián PFS (95% IS)	5,0 měsíců (4,4; 5,6)
6měsíční přežití (95% IS)	37,0 (23,0; 51,1)
1leté přežití (95% IS)	14,4 (3,6; 25,2)

Přežití pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera. U jednoho pacienta chyběly údaje k výpočtu PFS.

